

AD TEST

PODTLAKOVÁ TERAPIA V LIEČBE AKÚTNYCH A CHRONICKÝCH RÁN



1. Vznik NPWT sa spája s dvojicou mien

- a) Louis Argenta a Michael Morykwas
- b) Louis Pasteur a Philippe Mouret
- c) Louis Argenta a Philippe Mouret
- d) Philippe Mouret a Francois Dubois

2. V ktorom roku bol získaný patent za NPWT?

- a) r. 1989
- b) r. 1990
- c) r. 1991
- d) r. 2000

3. Drény podľa mechanizmu účinku delíme na

- a) aktívne a pasívne
- b) podtlakové, gravitačné, kapilárne – vzliavé
- c) otvorené a zatvorené
- d) terapeutické a profylaktické

4. Tradičná podtlaková drenáž – preväzy

- a) niekoľkokrát v priebehu jedného pracovného dňa
- b) každých 48 až 72 hodín
- c) dvakrát za mesiac
- d) preväzy nevykonávame vôbec

5. Pri hojení rán je najdôležitejšia

- a) skorá intervencia
- b) vyškolený zdravotnícky personál
- c) správne zhodnotenie rany
- d) všetky možnosti sú správne

6. Cirkulárna aplikácia NPWT systému na končatine:

- a) nemení prietok krvi v končatine
- b) zvyšuje prietok krvi v končatine
- c) od určitej hladiny podtlaku ischemizuje končatinu
- d) nevyžaduje zvýšenú pozornosť pri aplikácii podtlakového systému

7. Aplikácia podtlakového systému nespôsobuje:

- a) optimalizáciu manažmentu tekutín v rane
- b) stimuláciu granulácií
- c) diabetickú nohu
- d) bariéru medzi ranou a vonkajším prostredím

8. Medzi kontraindikácie NPWT nepatrí:

- a) malignita v rane
- b) odhalené kosti
- c) odhalené anastomózy ciev a nervov
- d) nediagnostikované fistuly

9. Aplikácia NPWT na primárne sa hojacu ranu

- a) nemá vplyv na hojenie rán
- b) zvyšuje frekvenciu serómov v rane
- c) znižuje percento infekčných komplikácií v rane
- d) spôsobuje znížené prežívanie pacientov

10. Účinky podtlakovej liečby na ranu možno pozorovať od hladiny podtlaku

- a) 25 mmHg
- b) 70 mm Hg
- c) 125 mm Hg
- d) 400 mmHg

11. Seat belt syndrome je súhrnný pojem, ktorý zahŕňa všetky typy zranení spojené s používaním:

- a) airbagov
- b) bezpečnostných pásov
- c) cyklistickej prilby
- d) systému HANS protection

12. Úraz je spôsobený:

- a) zrýchlením
- b) rotáciou
- c) spomalením
- d) ani jedným z uvedených

13. Syndróm bol popísaný v roku:

- a) 1985
- b) 1974
- c) 1962
- d) 1999

14. Seat belt syndróm je charakterizovaný:

- a) povrchovým pomliaždením až po devastáciu brušnej steny v celej hrúbke
- b) viscerálnymi zraneniami a poraneniami veľkých ciev
- c) poraneniami pohybového aparátu
- d) všetky uvedené možnosti sú správne

15. NPWT pri týchto úrazoch umožňuje

- a) zvládnuť infekciu a pri preväze pravidelnú *damage control*
- b) zlepšiť stav výživy pacienta
- c) zastavenie krvácania
- d) ani jedno z uvedených

16. NPWT je liečba riadeným:

- a) podtlakom
- b) pretlakom
- c) vztlakom
- d) ťahom

17. Naložený fungujúci podtlakový systém musí obsahovať:

- a) len penu a generátor
- b) len penu, fóliu a generátor
- c) len penu, fóliu, terčik a generátor
- d) penu, fóliu, terčik, kanister a generátor

18. Podtlakový systém možno použiť:

- a) na primárne aj sekundárne sa hojacu ranu
- b) nie je možné použiť na ranu
- c) nie je možné použiť
- d) nemá vplyv na ranu

19. Podtlaková liečba môže byť:

- a) pretlaková
- b) nízkotlaková a vysokotlaková
- c) len vysokotlaková
- d) len nízkotlaková

20. Kontaktná vrstva:

- a) blokuje prenos podtlaku na ranu
- b) blokuje odsávanie tekutín z rany
- c) nemá vplyv na prenos podtlaku na ranu
- d) devastuje granulačné tkanivo

